


# EHBO voor je kat

Tips voor eerste hulp bij ongelukken



@milo3rolo3



Het plan dat je huisdier zelf niet kan maken.

# Inhoudsopgave

## Spoedsituaties

Benauwdheid	4
Acute verlamdheid van de achterpoten	5
Braken	5
Plaskater	6
Brandwonden	6
Anorexie	7
Vergiftigingen	8
Aanrijdingen of vallen	9

## Huis, tuin & keuken ongelukjes

Kleine wondjes	10
Bijt- en vechtwonden	10
Niesziekte	11
Diarree	11
Jeuk	12
Veel drinken	12
Insectenbeet	12
Tekenbeet	14
Oogletsel	15

Heb je een kat? Dan is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen als hij klachten heeft of betrokken raakt bij een ongeval. Petplan heeft daarom dit EHBO boekje voor je gemaakt met de meest voorkomende klachten. Het is ingedeeld in de meest voorkomende spoedgevallen en huis, tuin en keuken ongelukjes. Er zijn natuurlijk meer spoedgevallen bekend dan degenen die wij benoemen. Twijfel je? Neem dan altijd even contact op met je dierenarts.



### Tip!



*Een gewond dier is vaak angstig en kan zelfs agressief worden. Een paar tips, om te voorkomen dat je zelf gewond raakt:*

- 1. Benader je kat op een rustige manier met een rustgevende stem.*
- 2. Een kat die pijn heeft is geneigd te gaan krabben of bijten. Door je kat goed vast te houden voorkom je om zelf gekrabbd of gebeten te worden. Doe dit met bijvoorbeeld een handdoek of een laken of laat iemand anders de kat vasthouden, voordat je gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Zorg er altijd voordat de kat goed kan blijven ademen.*
- 3. Gebruik de informatie uit dit boekje om zo snel mogelijk de aard van de verwonding vast te stellen. Bel daarna direct je dierenarts.*

# Spoedsituaties

## Benauwdheid

### Wat zie je?

Benauwdheid bij katten is soms subtiel. Wanneer een kat zijn neusvleugels openspert, kan dit betekenen dat hij moeilijk kan ademen en het benauwd heeft. Zijn ademhaling is snel en oppervlakkig: d.w.z. in rust meer dan 40x per minuut. Het kan zijn dat de ademhaling wat stug gaat, dit kan komen doordat de kat gaat naknijpen. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals stress, pijn, honger of misschien omdat hij moet plassen. Echt hele benauwde katten ademen met open bek, maar hele gestreste katten doen dit ook en dat is gelukkig niet meteen hetzelfde als benauwdheid. Bij de dierenarts kunnen katten dit bijvoorbeeld doen, maar als dit thuis gebeurt is het gek.

### Wat doe je?

Controleer of de halsband van je kat niet te strak zit en houd hem rustig, zodat hij goed kan blijven ademen en ga z.s.m. naar de dierenarts.



## Acute verlamdheid van de achterpoten

### Wat zie je?

Je kat kan bepaalde lichaamsdelen niet meer bewegen. Katten kunnen net als honden acuut verlamd raken aan de achterpoten. Natuurlijk zijn er veel verschillende oorzaken die daaraan ten grondslag kunnen liggen, maar wat je vaak bij katten ziet is acute verlamdheid ten gevolge van een bloedstolseltje dat vastloopt in het bloedvat die naar beide achterpoten loopt. Dit is heel pijnlijk.

### Wat doe je?

Ga direct naar de dierenarts om dit probleem uit te sluiten. Probeer je kat voorzichtig op te tillen en bij voorkeur in een kattenmandje te vervoeren. Probeer ervoor te zorgen dat je kat onderweg naar de dierenarts niet beweegt.

## Braken

### 1. Wat zie je?

Mijn kat braakt wel eens.

### Wat doe je?

Katten braken weleens, dit is niet altijd paniek. Sommige katten, zeker de langharige, hebben regelmatig last van haarballen. Geef kleinere porties licht verteerbaar voer van een goed merk en geen rauw vlees.



## **Braken** (vervolg)

### **2. Wat zie je?**

Mijn kat braakt plotseling, vaker of wordt er ziek van.

#### **Wat doe je?**

Ga dan direct naar de dierenarts. Ook als je weet dat je kat iets giftigs heeft gegeten.

Er zijn veel oorzaken van braken. De kans dat jou kan (veel) gaat braken is afhankelijk van de leeftijd en de leefomstandigheden van jouw kat of omdat het bijvoorbeeld een binnenkat of een buitenkat is. Bij buitenkatten is het belangrijk om ze 4x per jaar te ontwormen.

## **Plaskater**

### **Wat zie je?**

Een kat die vaak perst op de kattenbak in plashouding maar er komt niets of bijna niets uit. Deze symptomen lijken erg op een onschuldige blaasontsteking. Als de blaas heel vol is, wordt het ook pijnlijk en worden de katten slomer of gaan braken. Het zijn vaak mannelijke katten omdat die een nauwere plasbuis hebben. Een steentje/plug kan vastlopen in de plasbuis van een kat. Dit worden plaskaters genoemd.

#### **Wat doe je?**

Ga direct naar de dierenarts. Omdat de blaas volloopt, zonder dat dit te legen is door de kat zelf, is dit een spoedgeval! De blaas kan knappen of de nieren kunnen bezwijken. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de kans is dat de kat kan herstellen.

## **Brandwonden**

### **Wat zie je?**

Mijn kat heeft een brandwond.

### **Wat doe je?**

Houd de wond meteen onder, lauw stromend water. Doe dit gedurende minimaal dertig minuten. Waarschuw de dierenkliniek en zeg dat je onderweg bent met een kat met een brandwond. Wikkel de kat, of alleen het verbrande lichaamsdeel, in een schone, natgemaakte doek. Is het een kleinere wond, dek deze dan af met een steriel gaasje voordat je naar de dierenarts vertrekt.

## **Anorexie**

### **Wat zie je?**

Mijn kat heeft een verminderde eetlust.

#### **Wat doe je?**

Heel eventjes is dat niet zo erg en kan dit natuurlijk gebeuren. Echter kunnen katten –anders dan mensen of honden- helemaal niet goed tegen te lang niet eten, ze worden dan heel ziek. Merk je dat de eetlust van je kat achteruit gaat? Ga dan zeker na 2-3 dagen naar de dierenarts. Wacht niet te lang, eerder mag natuurlijk altijd!





## Vergiftigingen

### Wat zie je?

Mijn kat is ineens heel sloom, is plotseling aan het braken, plast ineens heel veel of helemaal niet meer.

### Wat doe je?

Ga direct naar de dierenarts want deze symptomen kunnen duiden op een vergiftiging. Lelies bijvoorbeeld kunnen acute nierschade bij katten geven. Zelfs het stuifmeel van de lelie is giftig. Hiervan kunnen ze heel ziek worden, vaak heel sloom, braken, hoge nierwaarden, soms abnormaal urineren. Ook bepaalde vlooienmiddelen voor honden, waar permethrine in zit, zijn heel giftig voor de kat. Let goed op dat je kijkt of een vlooienmiddel voor de kat geschikt is. Ook als hond en kat dikke maatjes zijn, pas op met het ontvlooien van je hond met deze middelen als de kat de hond likt! Er zijn nog veel meer giftige stofjes. Twijfel je? Bel direct de dierenarts.

### Petplan tip



*Pas op voor giftige bloemen, planten, fruit en groenten. Wist je bijvoorbeeld dat uien zeer giftig zijn voor de kat? Controleer bij twijfel altijd of het ingeslikte product of de (vloei)stof giftig is. Je kat gaat niet altijd braken als hij iets heeft gegeten dat giftig is. De dierenarts kan het braken dan eventueel opwekken.*

## Aanrijdingen of vallen

### Wat zie je?

Mijn kat heeft duidelijke wonden en/of loopt mank.

### Wat doe je?

Ga direct naar de dierenarts. Heeft je kat zichtbaar breuken? Probeer hem dan zo min mogelijk te laten bewegen. Verplaats de kat in dit geval enkel met professionele hulp. Bloedt de wond zeer ernstig? Druk de wond dan eerst dicht en verbind deze hierna. Ernstig bloedverlies kan leiden tot een shock. Het dier krijgt dan bleke slijmvliezen en oren en poten kunnen koud aanvoelen.

Katten zijn over het algemeen buitendieren. Als baasje weet je niet altijd wat er is gebeurd als je kat gehavend thuiskomt. Katten worden weleens aangereden of vallen van grote hoogtes, zoals van een balkon. Dit kan uiteenlopende schade geven. Laat de dierenarts de kat goed nakijken, de ernst van de situatie inschatten en het diertje pijnstillers geven.



# Huis tuin en keuken ongelukjes

## Kleine wondjes

Denk hierbij aan schaaf- of snijwondjes. Maak het wondje schoon en zorg dat de kat er niet aan kan likken, bijvoorbeeld door het omdoen van een kraag. Eventueel kan je ook honingzalfjes gebruiken. Een honingzalf is een wondzalf met een honingcomponent en is bij de dierenarts of apotheek te verkrijgen. Neem wel een goede met de juiste hoeveelheden honing en koop hem daarom liever niet bij een drogist.

Als er glas in de wond is probeer dit dan zo goed mogelijk te verwijderen en de wond te spoelen en / of het pootje te baden in groene Biotex of soda. En eventueel naar de dierenarts.

## Bijt- en vechtwonden

Katten hebben vaak last van vechtabcessen. 1-3 dagen na een gevecht met een andere kat ontstaat er een warme, pijnlijke ontsteking/bult, vaak onder de huid. Deze kan ook openknappen met pus. Soms krijgen deze katten koorts. Een abces moet eigenlijk worden geopend maar het is vrij pijnlijk. Naar de dierenarts gaan is verstandig.



## Niesziekte

Dit is een veelvoorkomende infectieziekte bij katten. De voornaamste klachten zijn niezen en snotteren, maar ook oogproblemen, koorts en heel soms mankheid kan voor komen. Het is een verzamelnaam voor bacteriële en virale infecties, maar de meeste zijn viraal.

Meestal zijn het milde, overgaande klachten. Er wordt tegen geënt, maar vaccinatie is niet altijd 100% beschermend. Desondanks is het wel aan te raden om te doen. Indien de kat zo verkouden is dat hij/zij niet meer wilt eten, ga dan naar de dierenarts. Ook als de klachten langer dan 7-10 dagen aanhouden of alleen maar erger worden.




## Diarree

Normale ontlasting is goed gevormd en heeft een bruine kleur. Wanneer je kat diarree heeft, dan is de ontlasting zachter en kan het zelfs waterig zijn. De kleur kan ook anders zijn dan normaal. Bij ernstige diarree kan er ook bloed of slijm bij de ontlasting zitten. Geef je kat licht verteerbare voeding zoals rijst met kip en onbeperkt vers water. Het is belangrijk dat de darmen tot rust komen. Als je kat klachten blijft houden of de situatie wordt slechter, neem dan contact op met je dierenarts.

### Neem ook contact op met de dierenarts:

- ✓ Als je bloed vindt in de ontlasting
- ✓ Bij koorts
- ✓ Bij braken en/of lusteloosheid
- ✓ Als je kitten jonger is dan 6 maanden



## Jeuk

Ook katten hebben weleens jeuk. De redenen zijn – naast andere oorzaken natuurlijk – vaak allergisch van aard. Dit kan voeding, omgeving of vlooiën zijn. Een kat met jeuk dien je altijd met een goed werkend product te ontvlooiën. Als de jeuk niet weggaat of heel ernstig is, ga dan naar de dierenarts.

## Veel drinken

Een kat die plots meer is gaan drinken is abnormaal. De stelregel is: drinkt je kat meer dan 100ml/kg per dag, dan drinkt hij teveel. Echter een toename in dorst is al een reden om alert te zijn. Check wel eerst of je geen ander voer bent gaan geven, want dit kan ook een dorstprikkel geven. Let er ook op hoeveel je kat plast.

Bij twijfel of de kat ook meer is gaan plassen, is een bloed en urine onderzoek bij de dierenarts een verstandige eerste stap. Haal nooit de waterbak weg, dan droogt je kat uit.

## Insectenbeet

Je kat heeft een bultje of een zwelling. Dit kan een insectenbeet zijn van bijvoorbeeld een wesp, mug, teek of bij. Katten zijn jagers en zien vaak alles wat vliegt of loopt als speelgoed. Wanneer je kat in zijn bek is gestoken door een wesp of bij, ga dan zo

snel mogelijk naar de dierenarts. Door de zwelling in de bek kunnen de luchtwegen versperd raken. Is je kat op een andere plek gestoken? Controleer dan of de angel nog in de huid zit en probeer deze met een pincet te verwijderen. Kun je geen angel vinden? Wrijf dan met een doekje over de plek, zodat de angel wellicht langs het doekje schuurt en je deze alsnog kunt vinden. Is het net gebeurd? Probeer de wond dan uit te drukken om het gif te verwijderen. Tegen pijn en zwelling kun je een cold pack of een koude doek doordrenkt met water op de gevoelige plek houden.



## Tekenbeet

Een teek is een klein spinachtig insect die diverse gevaarlijke ziekten kan overbrengen. Een teek heeft een platte vorm, acht pootjes en is zwartbruin van kleur. De teek voedt zich met het bloed van de gastheer. Dit kan zowel mens als dier zijn. Volgezogen zijn ze dik en rond en hebben ze een blauwgrijze kleur. Teken bijten zich vast in de huid en kunnen bacteriën overbrengen die via de bloedbaan hun gastheer infecteren. Als gevolg van een tekenbeet kunnen de ziekte van Lyme, Babesiose en Ehrlichiose ontstaan. Deze aandoeningen kunnen leiden tot chronische klachten en soms zelfs tot de dood.



Het is daarom belangrijk de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Je kunt de teek weghalen met een teekentang of een tekenpincet. Haal de teek zo dicht mogelijk op de huid weg. Hoe sneller je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans op besmetting. Maak de huid na het verwijderen schoon met bijvoorbeeld jodium, Betadine of Sterilon. Heeft je kat klachten na een tekenbeet? Raadpleeg dan altijd de dierenarts.

## Oogletsel

Door een vechtpartij of bijvoorbeeld het schampen van een tak kan je kat oogletsel oplopen. Het is hierbij ook mogelijk dat het hoornvlies in het oog is beschadigd. Je kunt oogletsel soms herkennen aan het gedrag van je kat. Hij wrijft bijvoorbeeld vaak in zijn oog, het oog is rood, traant veel of heeft een zwelling. Probeer te voorkomen dat je kat aan zijn oog zit en ga zo snel mogelijk naar de dierenarts. Let op: zie je een duidelijke verwonding in het ooglid, ga dan direct naar de dierenarts. Dit moet namelijk binnen een paar uur gehecht worden voor het beste resultaat.

### Petplan tip



*Geef je huisdier NOOIT huishoudelijke medicijnen. Veel van dit soort medicatie is giftig voor je huisdier en kan een negatieve invloed hebben op de door de dierenarts voorgeschreven medicatie.*







Vanaf  
**€12,16**  
per maand

## Waarom Petplan?

Petplan is opgericht door dierenartsen met de gedachte dat alle huisdieren de beste zorg verdienen. Wereldwijd vergoeden we inmiddels de zorg voor meer dan 1,5 miljoen huisdieren.

- ✓ Al 45 jaar de nummer 1 huisdierenverzekering wereldwijd
- ✓ Vrije dierenartskeuze
- ✓ Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten
- ✓ Klanten geven ons een 8,5
- ✓ Je declaratie snel uitbetaald